

Schulkinder

Alter→ ↓ Impfung	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	10. Jahr	11. Jahr	12. Jahr	13. Jahr	14. Jahr	15. Jahr
Diphtherie (dip) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV)	4-fach	nachholen					4-fach ¹		
Hepatitis B (HBV)	Grundimmunisierung (0/1/6 Monate) oder Auffrischung								
Mumps Masern (MMR) Röteln	(MMR Nachholen bei Ungeimpften oder nur 1x-Geimpften)								
Humane Papillomviren (HPV)²				2 x HPV (0/6 Monate)			2 x HPV ³ (0/6 Monate)		
Varizellen (VZV)			2 x VZV (wenn nicht bereits 2x geimpft oder Erkrankung durchgemacht)						
FSME				FSME					
Meningokokken⁴ (MEC4)						MEC4			
Influenza (IV)	IV jährlich								

Impfkalender aller empfohlenen Impfungen für Schulkinder

¹ Für Kinder, die vorher nur eine dip+Tet+IPV Impfung erhalten haben

² Die HPV Impfung im 1+1 Schema, soll so früh wie möglich, ab dem vollendeten 9. Lebensjahr (= 9. Geburtstag) begonnen werden

³ Catch-up Programm, ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zu einem günstigen Selbstkostenpreis

⁴ Nachholschema für MenB Individualimpfung und Indikationsimpfung für Risikopersonen siehe Kapitel Meningokokken

Kostenfrei

Nicht kostenfrei